









EVALUACIÓN PRIMARIA: *Cotejo de las Ejecuciones*

PASO	ACCIÓN ILUSTRADA	EJECUCIÓN COTEJADA
1		<input type="checkbox"/> Evaluación General Escena - 10 seg: <input type="checkbox"/> Peligros potenciales <input type="checkbox"/> Mecanismo de la lesión o causa de la enfermedad repentina <input type="checkbox"/> Número de víctimas involucradas en la emergencia
2		<input type="checkbox"/> Verificar si está consciente: <input type="checkbox"/> Sacudir con cuidado los hombros <input type="checkbox"/> Gritar: ¿Estas Bien? Si responde: <input checked="" type="checkbox"/> <i>Iniciar: Evaluación Secundaria</i> Si no responde:
3		<input type="checkbox"/> Activar SEM: Llamar al 9-1-1: <input type="checkbox"/> Buscar el teléfono más cercano o celular: Llamar al 9-1-1, o <input type="checkbox"/> Solicitar a alguien que llame: 9-1-1: "Tú el de la camisa roja, llama al 9-1-1" Si la víctima se encuentra boca abajo:
4		<input type="checkbox"/> Rodar al accidentado boca arriba: <input type="checkbox"/> Arrodillado detrás de la víctima <input type="checkbox"/> Cruzar piernas del accidentado <input type="checkbox"/> Una mano en cuello otra en cadera <input type="checkbox"/> Rodar hacia tí como una unidad, mantener estabilizado cabeza, cuello y espalda
5	 <p>Levantar barbilla e inclinar la cabeza hacia atrás</p> <p>Tracción de mandíbula (con trauma cervical)</p>	<input type="checkbox"/> A: ABRIR: Vía Respiratoria - TÉCNICAS: Sin daño cervical: <input type="checkbox"/> Levantar barbilla e inclinar cabeza hacia atrás Con daño cervical: <input type="checkbox"/> Tracción de la mandíbula <input type="checkbox"/> Tracción de la mandíbula modificada

PASO	ACCIÓN ILUSTRADA	EJECUCIÓN COTEJADA
6	 <p>Mantener la vía respiratoria abierta</p>	<input type="checkbox"/> B: BOCA: Cotejar si Respira - 3-5 seg: <input type="checkbox"/> ESCUCHA: Aire que sale de la boca <input type="checkbox"/> SENTIR: Aire que sale de la boca <input type="checkbox"/> VER: Pecho sube y baja Si no respira:
7		<input type="checkbox"/> B: BOCA: 2 ventilaciones lentas/completas: <input type="checkbox"/> Mantener la vía de aire abierta <input type="checkbox"/> Pinchar nariz de la víctima <input type="checkbox"/> Sellar con tus labios boca de la víctima <input type="checkbox"/> Administrar 2 ventilaciones lentas: 1 segundo cada una. <small>Reposiciona cabeza si no pasa. Si no pasa adm por atragantamiento</small> <input type="checkbox"/> Observar el Pecho: Debe subir y bajar en cada insuflación
8	 <p>Radial (Adulto y Niño)</p> <p>Carótido (Adulto y Niño)</p> <p>Braquial en infantes</p>	<input type="checkbox"/> C: CIRCULACIÓN: Cotejar Pulso - 5-10 seg: <input type="checkbox"/> CARÓTIDO: Localizar la manzana de Adam. Deslizar dedos hacia surco del cuello en lado más cerca de usted <input type="checkbox"/> RADIAL: Muñeca, lado del pulgar <input type="checkbox"/> Sentir un pulso por 5 a 10 segundos Si la persona no tiene un pulso: <input checked="" type="radio"/> Cotejar/Controlar: Hemorragia <input checked="" type="radio"/> Iniciar: CPR Si la persona tiene un pulso: <input checked="" type="radio"/> Reevaluar: Respiración <input checked="" type="radio"/> Si no Respira: Administrar: Respiración de Rescate Si la persona tiene pulso y respira:
9	 <p>Mantener vía aérea abierta</p> <p>Palpar</p>	<input type="checkbox"/> H: HEMORRAGIA: Verificar sangrado severo: <input type="checkbox"/> PALPAR: Mientras se mantiene con una mano la vía respiratoria abierta, la otra se pasa por todo el cuerpo en busca de sangrado <input type="checkbox"/> OBSERVAR: Por la presencia de sangrado profuso <input type="checkbox"/> CONTROLAR HEMORRAGIA: Presión directa, elevación, punto de presión

PASO	ACCIÓN ILUSTRADA	EJECUCIÓN COTEJADA
10		<input type="checkbox"/> S: SHOCK: Verificar la presencia de shock: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Cotejar por signos de shock <input type="checkbox"/> Dar primera ayuda en caso de shock: <ul style="list-style-type: none"> Elevar piernas, cubrir con manta
11	 <p>Estabilización en Línea</p> <p>Collar Cervical</p>  <p>Venas Yugulares Externas</p>  <p>Bronquios</p> <p>Tráquea</p>	<input type="checkbox"/> E: ESPINA CERVICAL: Evaluar cuello/cervical: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> COTEJAR POR: Fractura o lesión en la espina cervical: <ul style="list-style-type: none"> Si se identifica una lesión cervical: <ul style="list-style-type: none"> ● INMOVILIZAR CUELLO: <ul style="list-style-type: none"> ■ Estabilizar cabeza con las manos ■ Collar cervical (improvisado o comercial) <input type="checkbox"/> COTEJAR POR: Venas yugulares externas: <ul style="list-style-type: none"> ● Venas distendidas o dilatadas ● Venas aplanadas <input type="checkbox"/> COTEJAR POR: Desviaciones de la tráquea: <ul style="list-style-type: none"> ● Hacia cualquier lado del cuello ● Desviación orientada opuesto al trauma
12		<input type="checkbox"/> I: INCAPACIDAD: Evaluar daño al SNC: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nivel de Consciencia: <ul style="list-style-type: none"> ● Alerta y consciente ● Responde a estímulos verbales ● Responde a estímulos dolorosos ● No responde <input type="checkbox"/> Evaluación Neurológica: <ul style="list-style-type: none"> ● Un examen neurológico coteja: <ul style="list-style-type: none"> ■ Nivel de consciencia ■ Funciones motoras (e.g., Movimientos voluntarios) ■ Funciones sensoriales (lo que la víctima siente)
13		<input type="checkbox"/> Evaluación Secundaria: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Víctima Lesionada <input type="checkbox"/> Víctima Enferma Repentinamente