

ANATOMÍA Y KINESIOLOGÍA



ABREVIACIONES:

- ORIGEN: La porción proximal donde se une el tendón del músculo al hueso. Representa la unión más estable. Además, su tendón es de menor longitud, en comparación con la insersión
- INSERCIÓN: El extremo distal para la unión del músculo. Se caracteriza por ser la unión móvil y poseer un tendón relativamente largo.
- ACCIÓN O FUNCIÓN: Los movimientos principales que genera el músculo en la articulación
- N NERVIOS O INNERVACIÓN: Las fibras nerviosas específicas que estimular al músculo.
- P PALPACIÓN: Estrategia a seguir para palpar el músculo.


LA EXTREMIDAD SUPERIOR EL COMPLEJO DEL HOMBRO:

- LA CINTURA ESCAPULAR
- LA ARTICULACIÓN DEL HOMBRO

LA CINTURA ESCAPULAR


Movimientos Particulares que Producen los Músculos en la Cintura Escapular

- Abducción (protracción)
- Aducción (retracción)
- Rotación descendente (inferior, o hacia abajo)
- Rotación ascendente (superior, o hacia ariba)
- Elevación
- Depresión
- Inclinación lateral (inclinación externa, o hacia afuera)
- Inclinación medial (inclinación interna, o hacia adentro)
- Inclinación anterior (inclinación hacia arriba)
- Inclinación posterior (inclinación hacia abajo)



Músculos Esqueléticos Motores Primarios y Accesorios Responsables de los Movimientos a Nivel de la Cintura Escapular

- **▶** Pectoral menor
- Subclavio
- Serrato anterior, o mayor
- Trapecio (fibras de la porción superior, o primera)
- Trapecio (fibras de la porción media, o segunda)
- Trapecio (fibras de la porción inferior, o tercera)
- Romboide Mayor
- Romboide Menor
- Angular del omoplato, o elevador de la escápula



PECTORAL MENOR:

PECTORAL MENOR:

- Superficies anteriores (o externas) de la tercera, cuarta y quinta costillas.
- El extremo del apófisis coracoides, de la escápula.
- Abducción (protracción), rotación descendente, inclinación y depresión de la cintura escapular. Asiste en la inspiración, al levantar las costillas. Este músculo rara vez funciona aislado.
- N Nervio pectoral medio, que proviene de las raíces del plexo braquial. Sus fibras se originan desde octavo nervio cervical y del primer torácico (C8-T1).
- P Durante una depresión resistiva, que cause rotación descendente de la escápula (contracciónes activas), se palpa justamente en la porción inferior del apófisis coracoides.